



# HARVISTA™ 1,3 SC

DIVERSOS

3,3L



**Harvista™**  
an AgroFresh solution

Regulador de crescimento para o controlo do amadurecimento da fruta em macieiras e pereiras

**Formulação:** Suspensão concentrada (SC) com 1,3% (p/p) de 1-metilciclopropeno

**Grupo químico:** Cicloalqueno

**Autorização Excepcional de Emergência n.º 2021/13** concedida pela DGAV

**Classificação ADR:** Isento

**Classificação CLP:** Sem palavra-sinal  
Sem pictogramas de perigo

## Características

HARVISTA™ 1,3 SC é um produto regulador de crescimento das plantas. Dadas as suas características de inibição do etileno, tem a capacidade de atrasar o amadurecimento da fruta ainda na árvore. Este processo, permite um maior desfasamento do amadurecimento e com isso um alargamento do tempo de colheita, permitindo fazer uma melhor gestão desta. Paralelamente permite uma maior homogeneização dos frutos e consequentemente uma melhor qualidade dos mesmos.

## Condições de Aplicação

CULTURA	DOSE E VOLUME	APLICAÇÃO	IS
MACIEIRA E PEREIRA	Dose: 8,75 L/ha  Volume de Calda: 1000L/ha	Harvista™ 1.3 SC é aplicado por pulverização junto com água usando um sistema de injeção direta. A eficácia do produto requer que frutas e folhagens recebam cobertura uniforme por pulverização. Selecione bicos e combinações de pressão que fornecem gotas de pulverização de tamanho moderado (intervalo de 50-300 µm).  <b>Nº de Aplicações: 1</b>  <b>Época de Aplicação: BBCH 81-87</b>	3 dias

Harvista™ 1.3 SC é vendido em embalagens plásticas. Misture bem na embalagem original (pelo menos 5 minutos) antes de despejar em um recipiente dedicado conectado ao pulverizador.



# HARVISTA™ 1,3 SC

DIVERSOS

3,3L



**Harvista™**  
an AgroFresh solution

## Recomendações

- Não adicione água ao recipiente.
- A aplicação de Harvista™ 1.3 SC deve ser feita 3-21 dias antes da época de colheita comercial esperada. Entre em contato com seu representante AgroFresh para obter informações sobre o estágio de aplicação ideal.
- Não aplique em ventos superiores a 16km / h.
- Não aplique quando as temperaturas excederem 35 ° C.
- Não use refrigeração aérea ou equipamento de irrigação por pelo menos 1 hora após a aplicação.
- Não aplique se houver previsão de chuva dentro de 1 hora após a aplicação.

## Compatibilidade do produto

Os efeitos da combinação e as potenciais interações entre Harvista™ 1.3 SC e produtos contendo ácido naftalenoacético (NAA) ou ethephon não foram completamente avaliados. O uso desses produtos em plantações previamente tratadas com Harvista™ 1.3 SC pode reduzir os benefícios fornecidos por Harvista™ 1.3 SC.

Não permita que os produtos entrem em contato com cobre ou se misturem com produtos que contenham cobre.

LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):

1-metilciclopropeno – 0,01 em pera e maçã.

Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas atualizadas emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.