



# MARQUI®

## HERBICIDA

## 1 L / 5 L / 20 L / 200 L

UMA BOA ESCOLHA!

**Formulação:** Solução concentrada contendo 360 g/l ou 31% (p/p) de glifosato (sob a forma de sal de isopropilamónio)

**Grupo químico:** Aminoácido

**AV:** 0061

**Classificação ADR:** UN 3082

Documento de Transporte - UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A., (Contém glifosato), 9, III, 3 (E)

**Classificação CLP:**



### Características

O **MARQUI®** é um herbicida não selectivo de acção sistémica para o controlo de infestantes anuais e vivazes. Permitido antes da instalação de culturas e em técnicas de sementeira directa mas sempre antes da emergência da cultura. Culturas: vinha, pomares de amendoeiras, aveleiras, bananeiras, cerejeiras, limoeiros, laranjeiras, tangerineiras e clementinas, damasqueiros, macieiras, pereiras, pessegueiros, oliveira e o rabo-de-raposa na cultura da faveira.

Outras finalidades: Pousios, renovação de pastagens, zonas não cultivadas/vias de comunicação (áreas industriais, arruamentos, caminhos, bermas de estradas, campos de aviação, campos de jogos, cemitérios, vias férreas).

### Condições de Aplicação

CULTURA	ALVO	APLICAÇÃO
VIDEIRA, AMENDOEIRA, AVELEIRA, BANANEIRA, CEREJEIRA, LIMOEIRO, LARANJEIRA, TANGERINEIRA E CLEMENTINA, DAMASQUEIRO, MACIEIRA, PEREIRA, PESSEGUEIRO, NECTARINA E OLIVEIRA	Infestantes anuais e vivazes	Controlar as infestantes anuais monocotiledóneas e dicotiledóneas nas primeiras fases de desenvolvimento e as vivazes desde as primeiras fases de desenvolvimento até à floração. Máximo de 1 tratamento por ano e por ciclo cultural, com este ou outro produto, que contenha glifosato. Todas as espécies fruteiras: usar um equipamento de aplicação apropriado de modo a evitar o arrastamento da calda. Em oliveira, não pulverizar com azeitonas caídas e não colher as azeitonas caídas no solo tratado.
FAVEIRA	Infestantes anuais e vivazes	Controlar as infestantes anuais e Orobanché spp. (rabo-de-raposa), com aplicações efectuadas após a colheita, antes da sementeira da cultura. Máximo de 1 tratamento por ano e por ciclo cultural, com este ou outro produto, que contenha glifosato.
POUSIOS, RENOVAÇÃO DE PASTAGENS, ANTES DA INSTALAÇÃO DAS CULTURAS*, SEMENTEIRA DIRECTA*, ZONAS NÃO CULTIVADAS/VIAS DE COMUNICAÇÃO	Infestantes anuais e vivazes	ZONAS NÃO CULTIVADAS/VIAS DE COMUNICAÇÃO: Áreas industriais, arruamentos, caminhos, bermas de estradas, campos de aviação, campos de jogos, cemitérios e vias férreas. Controlar as infestantes vivazes desde as primeiras fases de desenvolvimento até à floração.

## Infestantes suscetíveis e doses de aplicação

INFESTANTES SUSCETÍVEIS	DOSE	INFESTANTES SUSCETÍVEIS	DOSE
ANUAIS *	2 – 4 L/ha	VIVAZES	
VIVAZES		<i>Junça (Cyperus rotundus)</i>	6 – 8 L/ha
<i>Erva-pata (Oxalis-pes-caprae)</i>	4 – 5 L/ha	<i>Juncinha (Cyperus esculentus)</i>	
<i>Escalracho (Panicum repens)</i>	4 – 7 L/ha	<i>Rabo-de-raposa (Orobancha spp.)</i>	0,13 L/ha
<i>Graminhão (Paspalum paspalodes)</i>		<i>Feto (Pteridium aquilinum) **</i>	
<i>Urtigas (Urtica spp.)</i>	5 – 8 L/ha	<i>Acácias (Acacia spp.)</i>	6 – 8 L/ha
<i>Corriola (Convolvulus arvensis)</i>		<i>Gramma (Cynodon dactylon)</i>	
<i>Silvas (Rubus spp.)</i>			

Em manchas de infestantes fazer aplicações localizadas com caldas de 1,5%.

\* Antes da instalação de culturas e em técnicas de sementeira direta, mas sempre antes da emergência da cultura, para o controlo de infestantes anuais nas primeiras fases de desenvolvimento também podem ser usadas as doses de 0,75 a 1,5 L/ha de MARQUI®.

\*\* No combate aos fetos fazer as aplicações quando todas as folhas estiverem bem abertas e ainda verdes.

**Intervalo de Segurança** – 7 dias em amendoeira, aveleira, bananeira, cerejeira, limoeiro, laranjeira, tangerineira e clementina, damasqueiro, macieira, oliveira, pereira, pessegueiro, nectarina e videira.

### LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):

**glifosato** – 1 em azeitona; 0,5 em uva, laranja, clementina e tangerinas; 0,1 em banana, cereja, amêndoa, avelã, maçã, pera, pêsego, limão, damasco e nectarina.

Estes LMR não excluem a consulta do site da comissão europeia EU Pesticide database – [Currente MRL Values](#)

Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.