

EX PE RT



PROTEÇÃO DO OLIVAL
SOLUÇÕES SELECTIS

selectis


20 ANOS AQUI À MÃO

www.selectis.pt

GAMA SELECTIS PARA A PROTEÇÃO DO OLIVAL

FINALIDADE	PRODUTO	COMPOSIÇÃO	MODO DE AÇÃO	IS (DIAS)	DOSE/ CONCENTRAÇÃO
Infestantes	MARQUI	360g/L de glifosato (SL)	sistémico não seletivo	28	2 a 8 L/ha**
	ORFEU	250 g/kg de flazassulfurão (WG)	sistémico não seletivo e residual	obs 1	60 a 200 g/ha**
	DAKAR PLUS	240 g/L de oxifluorfená (EC)	contacto e residual não seletivo	obs 2	0,6 L/ha
	ALIADO	40 g/L de diflufenicão + 160 g/L de glifosato (SL)	sistémico não seletivo e residual	35	6 a 7 L/ha
	ZENITE	500 g/L de diflufenicão (SC)	contacto, seletivo e residual	28	0,3 a 0,56 L/ha
Gafa da Oliveira	COBRE 50 SELECTIS	50% de cobre (sob a forma de oxicloreto de cobre) (WP)	contacto	7	0,4 a 0,5 kg/hL
	CALDA BORDALESA SELECTIS	20% de cobre (sob a forma de sulfato de cobre e cálcio) (WP)	contacto	7	1 a 2 kg/hL
	OXICUPER	700 g/L de cobre (na forma de oxicloreto) (SC)	contacto	15	185 mL/hL
Cercosporiose	COBRE 50 SELECTIS	50% de cobre (sob a forma de oxicloreto de cobre) (WP)	contacto	7	0,4 a 0,5 kg/hL
Olho-de-pavão	COBRE 50 SELECTIS	50% de cobre (sob a forma de oxicloreto de cobre) (WP)	contacto	7	0,4 a 0,5 kg/hL
	COLOMBO	250 g/kg de cresoxime-metilo + 125 g/kg de difenoconazol (WG)	sistémico e translaminar	n.a.	0,25 a 0,3 kg/ha
	TEBUTOP GOLD	250 g/L de tebuconazol (EW)	sistémico	n.a.	60 mL/hL
	OXICUPER	700 g/L de cobre (na forma de oxicloreto) (SC)	contacto	15	185 mL/hL
	DECIBEL	500 g/kg cresoxime-metilo (WG)	translaminar	apenas em tratamentos de Primavera	20 g/hL
Traça da Oliveira	ATLAS	100 g/L de lambda-cialotrina (CS)	contacto e ingestão	n.a.	7,5 mL/hL
	PETRA	25 g/L de deltametrina (EC)	contacto e ingestão	7	40 a 60 mL/hL
	VIJAY 32 NOVO	16% de <i>Bacillus thuringiensis</i> (WP)	contacto e ingestão	1	0,5 a 1 kg/ha
Mosca da Azeitona	PETRA	25 g/L de deltametrina (EC)	contacto e ingestão	7	40 a 60 mL/hL
Molhante	ABION E	346 g/L de parafina (EW)	molhante	-	3 L/ha

* : anuais: 2-4 L/ha; vivazes: 4-8 L/ha - **: outono: 60-100 g/ha; primavera: 60-200 g/ha
obs 1 : outono - 45; primavera - n.a. - **obs 2** : 7 dias sem azeitona no solo, 21 dias com azeitona no solo
n.a. - não aplicável, coberto pela época de aplicação

Esteja legalmente informado acerca da correta utilização de produtos fitofarmacêuticos. Nesta tabela não consta o número máximo de aplicações por produto fitofarmacêutico / finalidade, bem como outras exigências legais, pelo que recomendamos a leitura atenta dos rótulos.



ESTRATÉGIA DE PROTEÇÃO SELECTIS

	GOMO DE INVERNO	REBENTÇÃO	FORMAÇÃO DO GOMO FLORAL	INÍCIO DA FLORAÇÃO	PLENA FLORAÇÃO	ENDURECIMENTO DO CAROÇO	MUDANÇA DE COR	MATURACÃO
INFESTANTES ANUAIS (RESIDUAL)	ORFEU, ALIADO, ZENITE							
INFESTANTES ANUAIS E VIVAZES (SISTÊMICO)	MARQUI							
OLHO DE PAVÃO	COLOMBO, TEBUTOP GOLD, OXICUPER, DECIBEL		COBRE 50 SELECTIS, OXICUPER					
GAFA			CALDA BORDALESA SELECTIS, COBRE 50 SELECTIS, OXICUPER					
CERCOSPORIOSE			COBRE 50 SELECTIS					
TRAÇA DA OLIVEIRA	ATLAS, PETRA		VIJAY 32					
MOSCA DA AZEITONA			PETRA					
MOLHANTE	ABION E							

UTILIZE OS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS DE FORMA SEGURA. LEIA SEMPRE O RÓTULO E A INFORMAÇÃO RELATIVA AO PRODUTO ANTES DE O UTILIZAR.



CROP
EXPERT

selectis

A white, stylized graphic element resembling a leaf or a wave, positioned below the word 'selectis'.

20 ANOS AQUI À MÃO

www.selectis.pt