



TEBUTOP GOLD

FUNGICIDA

40 mL / 1 L / 5 L / 20 L

Formulação: Emulsão água em óleo com 250 g/l ou 25,5% (p/p) de tebuconazol

Grupo químico: Azol

AV nº 1658

Classificação DPD:

Nocivo; Perigoso para o ambiente

Classificação ADR: UN 3082

Documento de Transporte - UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A., (Contém tebuconazol), 9, III, 3 (E)

Classificação CLP: PERIGO



Características

Fungicida da família dos triazóis com actividade preventiva e curativa.

Acção sistémica com rápida absorção (2 horas após a aplicação), garantindo uma resistência à lavagem e elevada persistência de acção, incluindo novos tecidos formados após a aplicação.

Condições de Aplicação

CULTURA	DOENÇA	CONCENTRAÇÃO	APLICAÇÃO	IS
VINHA	Oídio	40 mL/hL ou 400 mL/ha	Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço de Avisos. Na sua ausência iniciar as aplicações a partir do estado de cachos visíveis. A persistência biológica do produto é de 14 dias. Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha DMI mais de 3 vezes, posicionados antes do fecho dos cachos. Os restantes tratamentos deverão ser realizados com fungicidas com outro modo de acção, como por exemplo, FLOR DE OURO.	14 dias
OLIVEIRA	Olho de pavão	60 mL/hL ou 600 mL/ha	Aplicar na Primavera, ao aparecimento da doença e em condições climáticas favoráveis. Repetir se necessário, após 2 a 4 semanas, efectuando no máximo 2 tratamentos, com este ou outro DMI. Se necessário, prosseguir os tratamentos no Outono com produtos cúpricos aprovados para a finalidade.	-

CULTURA	DOENÇA	CONCENTRAÇÃO	APLICAÇÃO	IS
TRIGO	Ferrugem amarela, ferrugem castanha, oídio e septoriose	1 L/ha	As aplicações devem ser feitas após o aparecimento dos primeiros sintomas, de modo a manter sãs as duas folhas superiores das plantas. No caso de variedades muito susceptíveis, e em anos com condições muito favoráveis ao desenvolvimento das doenças, repetir o tratamento passadas 2-3 semanas, no período compreendido entre o princípio do encanamento e o espigamento.	35 dias
CEVADA	Ferrugem castanha, helmintosporiose, oídio e rincosporiose	1 L/ha	As aplicações devem ser feitas após o aparecimento dos primeiros sintomas, de modo a manter sãs as duas folhas superiores das plantas. No caso de variedades muito susceptíveis, e em anos com condições muito favoráveis ao desenvolvimento das doenças, repetir o tratamento passadas 2-3 semanas, no período compreendido entre o princípio do encanamento e o espigamento.	35 dias

LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):

tebuconazol - 0,05 em azeitona; 0,1 em trigo; 0,5 em uva de mesa; 1 em uva; 2 em cevada.

Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas de Protecção Integrada emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.