



# WINNER

## HERBICIDA

## 1 L

### FLEXIBILIDADE EM PÓS-EMERGÊNCIA

**Formulação:** Dispersão em óleo (OD) com 40 g/L ou 4,25 % (p/p) de nicossulfurão

**Grupo químico:** Sulfonilureia

**AV:** 1018

**Classificação ADR:** UN 3082

Documento de Transporte - UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A., (Contém nicossulfurão), 9, III, 3 (E)

**Classificação CLP:** ATENÇÃO



### Características

O **Winner** é um herbicida sistémico e com alguma acção residual, da família das sulfonilureias, absorvido, principalmente, pelas folhas e pelas raízes, indicado para o controlo de infestantes na cultura de milho em pós-emergência. Inibe a biossíntese de aminoácidos essenciais (valina, leucina e isoleucina) impedindo a divisão celular e o crescimento da infestante.

#### INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS

Bredos (*Amaranthus blitoides*, *Amaranthus hybridus*, *Amaranthus retroflexus*), mostarda-negra (*Brassica nigra*), figueira-do-inferno (*Datura stramonium*), milhete (*Panicum dichotomiflorum*), *Panicum* sp., cabelo-de-cão (*Poa annua*), setaria (*Setaria viridis*), sorgo-bravo (*Sorghum halepense*).

#### INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCEPTÍVEIS

Catassol (*Chenopodium album*), milhã-digitada (*Digitaria sanguinalis* – até ao estado fenológico de 3 folhas, no máximo), milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), margaça (*Matricaria camomilla*), urtiga-morta (*Mercurialis annua*), erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*), Erva-moira (*Solanum nigrum*), morugem-branca (*Stellaria media*)

#### INFESTANTES RESISTENTES

Malvão (*Abutilon theophrasti*), corriola (*Convolvulus arvenses*), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), corriola-bastarda (*Fallopia convolvulus*).

### Condições de Aplicação

CULTURA	DOSE	APLICAÇÃO	IS
MILHO	1-1,5 l/ha	Aplicar WINNER na cultura de milho quando este apresentar 5-6 folhas e as infestantes 3-5 folhas. Usar a dose mais alta em solos ricos em matéria orgânica e/ou solos pesados e na presença de forte infestação.	–

### LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):

nicossulfurão – 0,01 em milho.

Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas de Protecção Integrada emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.