



**Formulação:** Concentrado para emulsão (EC) com 250 g/L ou 25,0% (p/p) de protioconazol.

**Grupo químico:** triazóis

**AV nº 1668**

**Classificação ADR:** UN 3082

Documento de Transporte - UN 3077, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A., (Contém protioconazol), 9, III, 3 (E)

**Classificação CLP:** ATENÇÃO



### Características

O ZELORA é um fungicida contendo protioconazol, pertencente à família química dos triazóis, sistémico, com atividade preventiva, curativa e erradicante, que atua na demetilação da síntese de esteróis (DMI).

### Condições de Aplicação

CULTURA	DOENÇA	DOSE (L/ha)	APLICAÇÃO	IS
TRIGO MOLE / TRIGO DURO	Ferrugem ( <i>Puccinia</i> sp.)	0,8	O ZELORA destina-se a ser aplicado preventivamente, devendo fazer-se uma primeira aplicação ao encanamento, desde a fase do 1º nó estar pelo menos 1 cm acima do nó de afilamento e a fase do 3º nó estar pelo menos 2 cm acima do 2º nó (BBCH 31-33). A segunda aplicação deverá ser efetuada desde a fase em que a folha bandeira está completamente aberta (apenas lígula visível) até ao final do emborrachamento, com a ponta da espiga visível (BBCH 39-49).	35 dias
TRIGO MOLE / TRIGO DURO	Fusariose ( <i>Fusarium</i> sp.)	0,8	O ZELORA destina-se a ser aplicado preventivamente, devendo fazer-se uma primeira aplicação desde a fase em que a folha bandeira está completamente aberta (apenas lígula visível) até a meio da fase de emborrachamento, com a bainha da folha bandeira apenas visivelmente inchada (BBCH 39-43). A segunda aplicação deverá ser efetuada desde a fase em que a espiga está 30% emergida até à fase da plena floração, com 50% das anteras maduras (BBCH 53-65).	35 dias
CEVADA HEXÁSTICA	Fusariose ( <i>Fusarium</i> sp.)	0,8		35 dias
CEVADA DÍSTICA	Fusariose ( <i>Fusarium</i> sp.)	0,8		35 dias

### LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):

protioconazol – 0,1 em trigo e 0,2 cevada.

Este LMR não excluem a consulta do site da comissão europeia EU Pesticide database – [Currente MRL Values](#)

Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.