



# CAPITAL 480 SC

FUNGICIDA

5L

## NOTÁVEL NO SEU PODER

**Formulação:** Suspensão concentrada (SC) com 480 g/L ou 41,63 % (p/p) de captana

**Grupo químico:** Ftalimidas

**AV:** 1854

**Classificação ADR:** UN 3082

Documento de Transporte - UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A., 9, III

**Classificação CLP:** ATENÇÃO



## Características

**CAPITAL 480 SC** é um fungicida de contacto com atividade preventiva com base em captana, da família das ftalimidas, que atua através da inibição da germinação dos esporos. Inibe vários processos metabólicos (multi-site), atuando em diversas enzimas.

## Condições de Aplicação

CULTURA	DOENÇA	CONC. (DOSE)	APLICAÇÃO	IS
MACIEIRA	Pedrado ( <i>Venturia inaequalis</i> )	312 mL/hL (DOSE MÁX 3,125 L/ha)	Realizar os tratamentos de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta desta informação, iniciar as aplicações ao aparecimento da ponta verde e repetir no estado de botão branco ou rosa. Os tratamentos durante a floração só serão efetuados em cultivares em que esta se prolongue por largo período de tempo, ou perante condições climáticas favoráveis à evolução da doença. Repetir à queda das pétalas e ao vingamento do fruto, se as condições climáticas favorecerem o desenvolvimento da doença. Persistência biológica: 10 a 12 dias (intervalo entre aplicações de 10 a 12 dias).	21 dias
PEREIRA	Pedrado ( <i>Venturia pyrina</i> )	312 mL/hL (DOSE MÁX 3,125 L/ha)		21 dias

## LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):

captana – 10 em maçã e pêra

Este LMR não excluem a consulta do site da comissão europeia EU Pesticide database – [Currente MRL Values](#)

Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.