



METASH 3%

DIVERSOS

500 g

MOLUSCICIDA INDICADO PARA O COMBATE A LESMAS E CARACÓIS

Formulação: Isco (pronto a usar) (RB) com 30 g/kg ou 3% (p/p) de metaldeído
AV: 1061

Classificação ADR: Isento

Classificação CLP: ATENÇÃO



Características

O METASH 3% é um moluscicida indicado para o combate a lesmas e caracóis em cereais, colza, batateira, beterraba (sacarina e forrageira), alface (e outras hortícolas de folha), morangueiro e outros pequenos frutos, videira (uva para vinificação e uva de mesa), pomóideas, prunóideas, frutos secos, citrinos, plantas ornamentais e pastagens.

O METASH 3% contém metaldeído, substância pertencente ao grupo químico dos aldeídos. Induz a segregação de grandes quantidades de muco, sendo as células que produzem muco, irremediavelmente destruídas, conduzindo à desidratação e morte. Atua por contacto e ingestão.

Condições de Aplicação

CULTURA	FINALIDADE	ÉPOCA DE APLICAÇÃO	DOSE POR APLICAÇÃO (Kg/ha)
Trigo, Cevada, Aveia, Centeio, Colza	Caracóis (<i>Helix aspersa</i>) Lesmas (<i>Deroceras sp.</i>)	Aplicar a partir da sementeira (nos sulcos ou na superfície do solo) e até BBCH 29 (9 ou mais rebentos laterais visíveis).	7
Batateira	Caracóis (<i>Helix sp.</i> , <i>Cepaea sp.</i>) Lesmas (<i>Arion sp.</i> , <i>Deroceras sp.</i> , <i>Limax sp.</i>)	Aplicar a partir da plantação (na superfície do solo) até à fase de senescência das folhas e do caule, antes da colheita (BBCH 97).	7
Morangueiro (ar livre e cultura protegida)	Caracóis (<i>Helix sp.</i> , <i>Cepaea sp.</i>) Lesmas (<i>Arion sp.</i> , <i>Deroceras sp.</i> , <i>Limax sp.</i>)	Aplicar a partir da plantação (na superfície do solo) até à fase de queda total das pétalas, fim da floração (BBCH 69).	7
Beterraba sacarina Beterraba forrageira	Caracóis (<i>Helix sp.</i> , <i>Cepaea sp.</i>) Lesmas (<i>Arion sp.</i> , <i>Deroceras sp.</i> , <i>Limax sp.</i>)	Aplicar a partir da plantação (na superfície do solo) até à fase de 5 folhas abertas (BBCH 15).	7

CULTURA	FINALIDADE	ÉPOCA DE APLICAÇÃO	DOSE POR APLICAÇÃO (Kg/ha)
Couve- portuguesa (inclui couve-tronchuda, couve-penca) Couve-galega	Caracóis (<i>Helix</i> sp., <i>Cepaea</i> sp.) Lesmas (<i>Arion</i> sp., <i>Deroceras</i> sp., <i>Limax</i> sp.)	Aplicar a partir da plantação (na superfície do solo) até à fase em que o caule principal atingiu o seu comprimento final, desenvolvimento da roseta completo (BBCH 39).	7
Framboesa Amora Mirtilo Groselheira-vermelha Groselheira- preta	Caracóis (<i>Helix</i> sp., <i>Cepaea</i> sp.) Lesmas (<i>Arion</i> sp., <i>Deroceras</i> sp., <i>Limax</i> sp.)	Aplicar a partir da plantação (na superfície do solo) até à fase de queda total das pétalas, fim da floração (BBCH 69).	7
Videira (uva para vinificação e uva de mesa)	Caracóis (<i>Helix</i> sp., <i>Cepaea</i> sp.) Lesmas (<i>Arion</i> sp., <i>Deroceras</i> sp., <i>Limax</i> sp.)	Aplicar desde a fase de repouso vegetativo (BBCH 00), na superfície do solo, até ao fim da floração (BBCH 69).	7
Macieira Pereira Marmeleiro Nespereira	Caracóis (<i>Helix</i> sp., <i>Cepaea</i> sp.) Lesmas (<i>Arion</i> sp., <i>Deroceras</i> sp., <i>Limax</i> sp.)	Aplicar desde a fase de repouso vegetativo (BBCH 00), na superfície do solo, até ao fim da floração (BBCH 69).	7
Pessegueiro (inclui Nectarina) Ameixeira Damasqueiro Cerejeira Gingeira	Caracóis (<i>Helix</i> sp., <i>Cepaea</i> sp.) Lesmas (<i>Arion</i> sp., <i>Deroceras</i> sp., <i>Limax</i> sp.)	Aplicar desde a fase de repouso vegetativo (BBCH 00), na superfície do solo, até ao fim da floração (BBCH 69).	7
Amendoeira Nogueira Avelã Castanheiro	Caracóis (<i>Helix</i> sp., <i>Cepaea</i> sp.) Lesmas (<i>Arion</i> sp., <i>Deroceras</i> sp., <i>Limax</i> sp.)	Aplicar desde a fase de repouso vegetativo (BBCH 00), na superfície do solo, até ao fim da floração (BBCH 69).	7
Laranjeira Laranjeira-azeda Limoeiro Lima Tangerineira (inclui Clementina e híbridos)	Caracóis (<i>Helix</i> sp., <i>Cepaea</i> sp.) Lesmas (<i>Arion</i> sp., <i>Deroceras</i> sp., <i>Limax</i> sp.)	Aplicar desde a fase de repouso vegetativo (BBCH 00), na superfície do solo, até ao fim da floração (BBCH 69).	7
Espinafre Alface Chicória-de-café Escarola Endívia	Caracóis (<i>Helix</i> sp., <i>Cepaea</i> sp.) Lesmas (<i>Arion</i> sp., <i>Deroceras</i> sp., <i>Limax</i> sp.)	Aplicar a partir da plantação (na superfície do solo) até à fase em que o caule principal atingiu o seu comprimento final, desenvolvimento da roseta completo (BBCH 39).	7
Craveiro Crisântemo Dália Roseira (espécies florícolas em cultura de ar livre e em cultura protegida)	Caracóis (<i>Helix aspersa</i>) Lesmas (<i>Deroceras</i> sp.)	Da plantação a BBCH 99 (até ao corte ou senescência). Aplicar na superfície do solo.	7
Prados e Pastagens	Caracóis (<i>Helix aspersa</i>) Lesmas (<i>Deroceras</i> sp.)	Da plantação a BBCH 15 (às 5 folhas visíveis) - pastos de recriação. Aplicar na superfície do solo.	7

Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas atualizadas emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.