



METASH 3%

META AS LESMAS E CARACÓIS EM SENTIDO!

selectis

AQUI À MÃO

www.selectis.pt

PERFIL

Composição: 30 g/kg de metaldeído

Família Química: Aldeído

Formulação: Isco pronto a usar (RB)

Finalidades: Moluscicida indicado para o combate a Lesmas e Caracóis em várias culturas.

Embalagens: 500g

MODO DE AÇÃO

METASH 3% induz a segregação de grandes quantidades de muco, levando à destruição das membranas das células que o produzem, conduzindo à sua desidratação e total colapso. Atua por contacto e ingestão.

FINALIDADES

METASH 3% está indicado para o combate a Lesmas e Caracóis devendo os iscos serem aplicados de preferência no início da infestação ou quando se observarem os primeiros sinais de danos podendo-se utilizar até um máximo de 21 kg/ha de **METASH 3%** por período cultural (campanha), com 3 aplicações no máximo por campanha e por cultura, com um intervalo mínimo entre aplicações de 7-10 dias, nas seguintes culturas e respetivos estados fenológicos:

CULTURA	FINALIDADES	ÉPOCA DE APLICAÇÃO	
Trigo, Cevada, Aveia, Centeio	Caracóis (<i>Helix aspersa</i>) Lesmas (<i>Deroceras sp.</i>)	Aplicar a partir da sementeira (nos sulcos ou na superfície do solo) e até BBCH 29 (9 ou mais rebentos laterais visíveis).	
Colza			
Batateira	Caracóis (<i>Helix sp.</i> , <i>Cepæa sp.</i>) Lesmas (<i>Arion sp.</i> , <i>Deroceras sp.</i> , <i>Limax sp.</i>)	Aplicar a partir da plantação (na superfície do solo) até à fase de senescência das folhas e do caule, antes da colheita (BBCH 97).	
Morangueiro (ar livre e cultura protegida)		Aplicar a partir da plantação (na superfície do solo) até à fase de queda total das pétalas, fim da floração (BBCH 69).	
Beterraba sacarina, Beterraba forrageira		Aplicar a partir da plantação (na superfície do solo) até à fase de 5 folhas abertas (BBCH 15).	
Couve-portuguesa, (inclui couve-tronchuda, couve-penca), Couve-galega		Aplicar a partir da plantação (na superfície do solo) até à fase em que o caule principal atingiu o seu comprimento final, desenvolvimento da roseta completo (BBCH 39).	
Framboesa, Amora, Mirtilo, Groselheira-vermelha, Groselheira-preta		Aplicar a partir da plantação (na superfície do solo) até à fase de queda total das pétalas, fim da floração (BBCH 69).	
Videira (uva para vinificação e uva de mesa)		Aplicar desde a fase de repouso vegetativo (BBCH 00), na superfície do solo, até ao fim da floração (BBCH 69).	
Macieira, Pereira, Marmeleiro, Nespereira		Aplicar desde a fase de repouso vegetativo (BBCH 00), na superfície do solo, até ao fim da floração (BBCH 69).	
Pessegueiro (inclui Nectarina), Ameixeira, Damasqueiro, Cerejeira, Gingebra		Aplicar desde a fase de repouso vegetativo (BBCH 00), na superfície do solo, até ao fim da floração (BBCH 69).	
Amendoeira, Nogueira, Avelleira, Castanheiro		Aplicar desde a fase de repouso vegetativo (BBCH 00), na superfície do solo, até ao fim da floração (BBCH 69).	
Laranjeira, Laranjeira-azeda, Limoeiro, Lima, Tangerineira (inclui Clementina e híbridos)		Aplicar desde a fase de repouso vegetativo (BBCH 00), na superfície do solo, até ao fim da floração (BBCH 69).	
Espinafre, Alface, Chicória-de-café, Escarola, Endívia		Aplicar a partir da plantação (na superfície do solo) até à fase em que o caule principal atingiu o seu comprimento final, desenvolvimento da roseta completo (BBCH 39).	
Craveiro, Crisântemo, Dália, Roseira (espécies florícolasem cultura de ar livre e em cultura protegida)		Caracóis (<i>Helix aspersa</i>) Lesmas (<i>Deroceras sp.</i>)	Da plantação a BBCH 99 (até ao corte ou senescência) Aplicar na superfície do solo.
Prados e Pastagens			Da plantação a BBCH 15 (às 5 folhas visíveis) - pastos de recriação. Aplicar na superfície do solo.

VALOR

Excelente atratividade e palatabilidade

Ação imediata

Persistência

Flexibilidade de aplicação

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.

Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

www.selectis.pt

